


## Eigener IgG-Corona-Antikörper-Titer

Zwischenbericht (21.04.2022) – nach dem 1. Booster



### Befunde:

1. Nach dem neuen Bild vom 21.04.2022 liegen wir jetzt bis 5 Monate nach dem ersten Booster immer noch deutlich über ca. 300 BAU/ml.
2. Eine Ausnahme: Der niedrigste Titer für einen „jungen“ (66 J.) Teilnehmer betrug knapp 4 Monate nach dem 1. Booster „nur“ noch 212 BAU/ml (Bild), er erhielt in der Zwischenzeit den 2. Booster, knapp 1 Monat danach hat er knapp 1.000 BAU/ml.
3. Der AK-Titer-Abfall beträgt derzeit ca. 25 % jeweils pro neuer Monat.

### Fazit:

- Der Booster-Effekt ist vollkommen ausreichend, wir liegen mit einer Ausnahme alle bei deutlich über ca.300 BAU/ml und können geduldig abwarten, weil
  - nach Prof. Dr. Bobrowski, Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, eine Person mit „einem Wert von 44 BAU/ml mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Immunschutz gegen Corona besitzt“ (FOCUS-Online 21.02.2022);
  - wir auf eine aktuelle Anfrage bei der zuständigen Fachgesellschaft, wann der 2. Booster erfolgen sollte bzw. ob man trotz hoher AK-Titer unbedenklich boostern sollte, noch keine Antwort haben.

### Ausblick:

- Vorläufig können wir mit dem 2. Booster getrost abwarten, bis wir mit unserem **IgG-Titer in BAU/ml** in die Nähe von **100** BAU/ml kommen. Dann sehen wir weiter.
- In Zukunft werden wir auch den Impfstoff (BioNTech, Moderna) und die Dosis beachten.